

# Medikamentenwirkung mit Labortests überwachen

Müssen Sie dauerhaft Medikamente einnehmen? Dann sollten Sie sich regelmäßig auf Nebenwirkungen untersuchen lassen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) empfiehlt Kontrolluntersuchungen mit Labortests bei diesen Medikamenten:

MÖGLICHES MAKRO-KÜRZEL (einzelne Handelsnamen)	ZEITRAUM	INTERVALL						
		Wöchentlich	Alle 2 Wo.	Alle 4 Wo.	Alle 8 Wo.	Im Quartal	Halbjährlich	Jährlich
<b>Azathioprin</b> (Imurek)	2 Mo. lang	x						
	>					x		
<b>Chlorquin</b> (Resochin)	4 Mo. lang				x			
	>					x		
<b>Cyclophosphamid</b> (Endoxan)							x	
<b>Leflunomid</b> (Arava)	6 Mo. lang		x					
	>					x		
<b>Mesalazin / Sulfasalazin</b> (Salofalk)	3 Mo. lang		x					
	weitere 3 Mo.			x				
	>						x	
<b>Methotrexat</b> (Lantarel)	1 Mo. lang	x						
	weitere 2 Mo.		x					
	>					x		
<b>Clozapin</b> (Leponex)	4 Mo. lang	x						
	>			x				
<b>Olanzepin</b> (Zyprexa)	3 Mo. lang					x		
	>							x
<b>Amiodaron</b>							x	
<b>Dronedaron</b> (Multaq)	6 Mo. lang			x				
	>					x		
<b>Risperidon</b> (Risperdal)							x	
<b>Phenytoin</b> (Zentropil)	3 Mo. lang			x				
	>							x
<b>Valproat</b> (Ergenyl, Orfiril, Leptilan)							x	
<b>Lithium</b> (Quilonum)	1 Mo. lang	x						
	weitere 5 Wo			x				
	>							x
<b>Carbamazepin</b>	1 Mo. lang	x						
	weitere 5 Wo			x				
	>							x
<b>Primidon</b> (Liskantin, Mylepsinum)							x	
<b>Agomelatin</b> (Valdoxan)	3 Mo. lang			x				
	>							x
<b>Phenprocoumon</b> (Marcumar)							x	
<b>ACE-Hemmer/Sartan</b>							x	
<b>Diuretikum</b>							x	
<b>Kortison &gt; 7,5mg/Tag</b>							x	
<b>Heparin NMH'</b> (Mono Embolex, Clexane usw.)							x	
<b>Statin [Myopathie]</b>							x	
<b>Digitalis [Intoxikationszeichen]</b>							x	
<b>Thiamazol [Agranulozytose]</b>							x	

Bitte beachten Sie: Die Liste ist nicht abschließend. Die angegebenen Kontrolluntersuchungen sind ein Minimal-Standard für die stabile Dauerbehandlung von Erwachsenen. In Einzelfällen sollen die aufgeführten Untersuchungen ergänzt werden. Insbesondere in den Einstellungs- und Umstellungsphasen können weitere Untersuchungen erforderlich sein. Fragen Sie Ihren Arzt!